



AminoStar 18

Antiestresante y Activador de Crecimiento Polvo Soluble

AminoStar 18, es un producto agrícola formulado especialmente para contrarrestar los efectos negativos ocasionados en los cultivos por condiciones desfavorables de crecimiento, activando los procesos fisiológicos de las plantas mediante el aporte exógeno de aminoácidos, vitaminas, compuestos antioxidantes y promotores de crecimiento.

Al aplicar **AminoStar 18** de manera foliar o al suelo, penetra rápidamente a la planta, influyendo en los procesos de fotosíntesis, división y elongación celular, citogénesis y respiración, además, evita el proceso interno de estrés oxidativo, mediante el cual las

plantas se avejentan por una sobreproducción de radicales libres, esto como respuesta a factores adversos de crecimiento o a la infección por agentes patógenos.

AminoStar 18 es una herramienta útil en el manejo de cultivos afectados por virus, aunado a prácticas de control de plagas transmisoras, ayuda a disminuir el daño ocasionado por estos, logrando reactivar el crecimiento y obtención de calidad de las cosechas.

COMPOSICIÓN

Aminoácidos libres	18.00 %
Vitaminas	2.80 %
Antioxidantes	10.00 %
Complejo hormonal	1230 ppm
Acondicionadores e inertes	69.07 %
TOTAL	100.0 %

Beneficios:

- Dinamiza los procesos metabólicos de las plantas.
- Evita el desgaste energético de los cultivos.
- Promueve el crecimiento de las plantas.
- Auxiliar en el manejo de enfermedades virales.
- Incrementa la síntesis de proteínas.



PRESENTACIÓN: 250 g.



ACTIVADORES FISIOLÓGICOS



AminoStar 18, es una herramienta útil en el manejo de cultivos afectados por virus, aunado a prácticas de control de plagas transmisoras, ayuda a disminuir el daño ocasionado por estos, logrando reactivar el crecimiento y obtención de calidad de las cosechas.

Dosis y forma de aplicación

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Tomate, Chile, Tomatillo y Berenjena	150-250 g/ha	Iniciar con dosis bajas 15 días después del trasplante, repetir a intervalos de 7 a 21 días, dependiendo de las condiciones climáticas y estado fenológico del cultivo.
Melón, Sandía, Pepino y Calabaza	100-250 g/ha	Iniciar con dosis bajas 15 días después del trasplante, repetir a intervalos de 7 a 21 días, dependiendo de las condiciones climáticas y estado fenológico del cultivo.
Papayo	100-150 g/100 litros de agua	Iniciar aplicaciones 30 días después del trasplante, repetir a intervalos de 15 a 30 días, dependiendo de las condiciones climáticas e incidencia de insectos vectores de virus.

Garantía BioStar México

BioStar México S. de R.L. de C.V. garantiza que el contenido del envase corresponde a la composición señalada en la etiqueta. Sin embargo, ni el fabricante ni sus distribuidores se hacen responsables por los resultados que se obtengan del producto, ya sea solo o en combinación con otros productos. Tampoco se hacen responsables por el incumplimiento de las indicaciones, toda vez que la dosificación, manejo y aplicación del producto, están fuera del control de los mismos.



www.biostar.mx

Laguna del Carmen No. 1120 Col. La Salle
Saltillo, Coahuila, México
C.P. 25240 Tel: (844) 416 10 30

ACTIVADORES FISIOLÓGICOS